



# آموزش به بیمار

## فشار داخل چشمی بالا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  
بهداشتی و درمانی تهران

- در صورتی که دچار درد شدید چشم همراه با قرمزی و حالت تهوع می باشید به اورژانس بیمارستان چشم مراجعه نمایید.
- ویزیت بیماران دارای فشار چشم بالا زود صورت می گیرد (در این مرکز این موارد جزء مواردی می باشد که سریع به آن رسیدگی می شود).
- اگر بیمار باید سرم مانیتول دریافت کند، لازم است که تمام سابقه قبلی خود را به پزشک اعلام کند (مانند بیماری دیابت، فشار خون بالا، بیماری کلیوی و همچنین داروهای مصرفی خود).
- بهتر است قبل از تزریق سرم، مثانه خالی گردد (به دلیل ادرار آور بودن این دارو).
- مراجعه به پزشک ویزیت کننده خود در درمانگاه اورژانس، یک ساعت پس از تزریق سرم، جهت کنترل مجدد فشار خون الزامی است.
- مراجعه بعدی شما جهت ویزیت مجدد بر اساس تاریخ و ساعت قید شده در برگه خلاصه پرونده می باشد.
- پرونده خود را هنگام ترخیص به پرستار واحد اورژانس تحویل دهید.
- در صورت نیاز، توسط پزشک اورژانس به درمانگاه گلوکوم ارجاع داده می شوید در این حالت موارد درمان و پیگیری شما در درمانگاه گلوکوم انجام خواهد شد.