



## آموزش به بیمار اندوفتالمیت



عفونت فضای داخل چشم (زجاجیه) را اندوفتالمیت می گویند .  
اندوفتالمیت به دلیل درگیری مستقیم داخل چشم می تواند بسیار مخرب باشد و به همین دلیل نیازمند مراجعه مستقیم به چشم پزشک می باشد .

### مواردی که باعث ایجاد اندوفتالمیت می شود

- \* جراحی های قبلی و جراحی های جدید
- \* ضربه به چشم که باعث پاره شدن کره چشم می شود .
- \* عفونت های زمینه ای یا سیستمیک

### توصیه

- \* بعد از جراحی چشم جهت جلوگیری از عفونت، قطره تجویز می شود و قطره ها باید به صورت منظم مصرف شود.
- \* در صورت جراحی از دست زدن به چشم اجتناب شود.
- \* یک هفته بعد از جراحی استحمام انجام شود و بلافاصله بعد از جراحی از دوش گرفتن اجتناب شود .
- \* در صورت جراحی علائم هشدار دهنده مانند درد، قرمزی، تاری دید، ترشح و تورم پلک به پزشک معالج و در صورت در دسترس نبودن به صورت اورژانس به چشم پزشک مراجعه شود .

### اندوفتالمیت به دنبال عفونت زمینه ای (سیستمیک)

گاهی عفونت های سیستمیک مانند عفونت های روده ای - ادراری که می تواند از طریق خون باعث درگیری به صورت عفونت داخل چشم شود به همین دلیل افرادی که دچار این بیماری ها هستند در صورت بروز هرگونه علائم به چشم پزشک مراجعه نماید .

### علائم

هرگونه تاری دید ، درد، ترشح و قرمزی چشم

### درمان اندوفتالمیت

- \* در صورت موارد خفیف، تزریق آنتی بیوتیک داخل چشم صورت می گیرد.
- \* در صورت موارد شدید ، عمل جراحی ویتروکتومی انجام می شود و برداشتن یا خارج کردن زجاجیه عفونی که همراه با تزریق آنتی بیوتیک داخل چشمی صورت می گیرد .

آموزش به بیمار دفتر پرستاری بیمارستان فارابی