



بیمارستان فارابی تهران
تلف: علمی چشم پزشکی

آموزش به بیمار



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی تهران

ضربه به چشم

- جهت کاهش تورم، درد و کبودی حتما در ساعت اولیه از کمپرس سرد هر بار به مدت ۱۵ دقیقه استفاده گردد.
- از دستکاری محل ضربه دیده و قرار دادن دستمال کاغذی و یا پوشش آلوده بر روی چشم خودداری کنید.
- به توصیه های پزشک جهت مراجعه مجدد و استفاده از دارو به شکل صحیح، توجه گردد.
- در صورت کاهش دید چشم یا درد شدید چشمی فوراً به نزدیک ترین مرکز چشم پزشکی مراجعه نمایید.
- حتماً محافظ چشمی را که در درمانگاه اورژانس چشم جهت چشم آسیب دیده شما بر روی چشم قرار داده اند تا زمانی که پزشک به شما توصیه کرده است، حفظ نمایید.
- در صورت وارد شدن ضربه به چشم، قبل از رسیدن به مرکز اورژانس چشم پزشکی از شستن چشم با آب و یا ریختن قطره جدا " خودداری نمایید.
- از خارج کردن جسم خارجی نفوذ کرده در چشم و دستکاری آن جدا " اجتناب نمایید.
- در صورتی که ضربه وارده به چشم در اثر نزاع و درگیری بوده است، در همان زمان نسبت به انجام موارد پزشکی قانونی اقدام نمایید.