



آموزش به بیمار پارگی پلک



در صورتی که دچار پارگی پلک یا آسیب به پلک شده باشید معاینه چشم توسط چشم پزشک ضروری می باشد. در صورتی که خونریزی از زخم زیاد باشد و چشم آسیب ندیده باشد و نرمال باشد تا مراجعه به چشم پزشک می‌توانید با گاز استریل پانسمان کنید.

ترمیم پارگی پلک

- * ترجیحا تحت نظر یا نظارت چشم پزشک انجام شود.
- * در صورتی که بعد از ترمیم پارگی پلک یا جراحی پلک، چشم باز بماند یا بسته شدن آن به صورت طبیعی باشد، حتما به پزشک معالج و یا چشم پزشک اورژانس مراجعه نماید.
- * گاهی به همراه پارگی پلک مجرای اشکی بیمار نیز ممکن است دچار پارگی شود که در آن صورت به همراه ترمیم پارگی پلک جراحی مجرای اشکی هم انجام می‌شود.
- * جهت جراحی مجرای اشکی سوند خاصی برای مجرای اشک گذاشته می شود که معمولا تا سه ماه در محل جراحی می‌ماند.
- * در صورت پارگی پلک اگر بیمار واکسن کزاز تزریق نکرده است و زخم آلوده باشد جهت تزریق واکسن کزاز به چشم پزشک اطلاع داده شود.
- * برای پیشگیری از عفونت، آنتی بیوتیک خوراکی تجویز می شود.

آموزش به بیمار دفتر پرستاری بیمارستان فارابی